

Como armazenar o medicamento?

Mantenha o medicamento na embalagem original. Esse medicamento é termolábil, ou seja, deve ser refrigerado.

Conserve o produto em temperatura entre 2°C e 8°C. De preferência, armazene o medicamento no meio da geladeira, longe das extremidades e portas.

ATENÇÃO: Sempre que for retirar o medicamento na farmácia, levar caixa térmica com gelo reutilizável para conservação adequada do medicamento!



Seu Tratamento:

Data da Receita: ____ / ____ / ____

Medicamento: **Ciclofosfamida**

Dose: _____

Frequência: _____

Tempo de uso: _____

ATENÇÃO! Em caso de alteração de dose, desconsiderar a orientação acima e procurar a farmácia para nova orientação.



Acesse as produções e artigos publicados da Liga Álvaro Bahia



Serviço de Farmácia

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou entre em contato com o Serviço de Farmácia da Oncologia do Hospital Martagão Gesteira através do e-mail:

farmaciaonco@martagaogesteira.org.br

Orientações Farmacêuticas



CICLOFOSFAMIDA

Elaborado por:
Farm^a Monalisa Chaves

Residente
Farm^a Victória Cabral



LIGA
ÁLVARO
BAHIA
CONTRA
A MORTALIDADE
INFANTIL

Martagão
Gesteira HOSPITAL
DA CRIANÇA

O que é a ciclofosfamida e para que serve?

A ciclofosfamida é um medicamento utilizado no tratamento do câncer, interferindo no crescimento de certos tumores, como leucemias, linfomas e neuroblastoma.

Como o medicamento funciona?

A ciclofosfamida age interrompendo a produção de células anormais (células do câncer).



Orientações para o uso

O comprimido deve ser engolido inteiro com o auxílio de um copo de água, sem mastigar ou partir o comprimido.

O medicamento deve ser tomado de preferência pela manhã, após uma refeição leve para evitar enjoos.

É importante ter alguns cuidados com o manuseio desse medicamento, sendo alguns deles: evitar contato direto e colocar o comprimido diretamente em um copo descartável quando for tomá-lo ou utilizar luvas para proteger as mãos.

O que fazer se esquecer de usar o medicamento?

Se uma dose for esquecida ou ocorrer vômito, não compense a dose. Ao invés disso, aguarde até o horário para a próxima dose. Não tome duas doses ao mesmo tempo.

O que fazer se ingerir quantidade maior do medicamento?

Caso seja ingerida uma quantidade maior, procure a Unidade de Saúde e leve junto a embalagem ou bula.

Quais efeitos indesejados podem aparecer?

Dor de cabeça, anorexia, fraqueza; dores no estômago, diarreia, perda de apetite, náuseas e vômitos.

Se você sentir algum destes sintomas durante seu tratamento informe ao seu médico ou farmacêutico.



Orientações de descarte

Não descarte sobras de medicamento em lixo comum ou no vaso sanitário.

Se o medicamento sobrar, devolva à Farmácia da Oncologia do Hospital Martagão Gesteira para o descarte adequado.

