

Como armazenar o medicamento?

Mantenha o medicamento na embalagem original, bem fechado, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e protegido da luz e da umidade, deixando longe de locais como cozinha e banheiro.

Armazene os medicamentos longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos.



Seu Tratamento:

Data da Receita: ____ / ____ / ____

Medicamento: Tretinoína

Dose: _____

Frequência: _____

Tempo de uso: _____



Acesse as produções e artigos publicados da Liga Álvaro Bahia

Serviço de Farmácia

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou entre em contato com o Serviço de Farmácia da Oncologia do Hospital Martagão Gesteira através do e-mail:

farmaciaonco@martagaogesteira.org.br

Orientações Farmacêuticas



TRETINOÍNA

Elaborado por:
Farm^a Monalisa Chaves
Farm^a Salustiana Pomponet

Residentes
Farm^a Victória Cabral



LIGA
ÁLVARO
BAHIA
CONTRA
A MORTALIDADE
INFANTIL



ATENÇÃO! Em caso de alteração de dose, desconsiderar a orientação acima e procurar a Farmácia para nova orientação.

O que é a Tretinoína e para que serve?

A tretinoína é um medicamento utilizado para o tratamento de um tipo de leucemia (doença maligna do sangue), conhecida como leucemia promielocítica aguda.

Como o medicamento funciona?

A Tretinoína atua inibindo a produção de células anormais (células do câncer).



Orientações para o uso

A cápsula deve ser engolida inteira com o auxílio de um copo de água.

Não partir ou mastigar a cápsula.

Recomenda-se a ingestão junto com uma refeição ou pouco depois dela.

É importante ter alguns cuidados com o manuseio desse medicamento, sendo alguns deles: evitar contato direto e colocar o comprimido diretamente em um copo descartável quando for tomá-lo ou utilizar luvas para proteger as mãos.

O que fazer se esquecer de usar o medicamento?

Assim que se lembrar, tome a dose esquecida junto com uma refeição.

O que fazer se ingerir quantidade maior do medicamento?

Caso seja ingerida uma quantidade maior, procure a Unidade de Saúde e leve junto a embalagem ou bula.

Quais efeitos indesejados podem aparecer?

Alguns dos efeitos indesejados mais comuns são: secura da boca, pele seca, rachaduras na pele, inchaço, náuseas, vômitos, dor de cabeça, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre, desconforto estomacal, fraqueza.

Se você sentir algum destes sintomas durante seu tratamento informe ao seu médico ou farmacêutico.



Orientações de descarte

Não descarte sobras de medicamento em lixo comum ou no vaso sanitário.

Se o medicamento sobrar, devolva à Farmácia da Oncologia do Hospital Martagão Gesteira para o descarte adequado.

